

Romney

chov ovcí pod širým nebem

Milan Dad'ourek

© 2017

Obsah

I. Úvod.....	3
Komu má publikace pomoci.....	3
O autorovi.....	3
II. Základní informace o romney.....	4
Popis plemene.....	4
Proč plemeno romney.....	4
Systém chovu.....	5
III. Založení chovu.....	6
Půda.....	6
Velikost stáda.....	6
Nákup chovných ovcí.....	6
Mít svého berana?.....	7
Výběr plemeníka.....	7
Úřední šiml.....	8
Evidence a značení zvířat během chovu.....	8
Nákup sena na zimu.....	9
IV. Zařízení pastvin.....	10
Organizační uspořádání pastvin.....	10
Ohrazení pastvin.....	11
Vybavení pastvin.....	12
V. Chov romney aneb jak bačovat.....	15
Ovčácké pomůcky.....	15
Krmení.....	15
Skladování sena na zimu.....	16
Sledování zdraví a pohody ovcí.....	17
Zabezpečení pastviny.....	17
Hygiena na pastvině.....	17
Péče o pastviny.....	18
Odčervování.....	18
Vakcinace.....	19
Stříhání vlny.....	20
Údržba paznehtů.....	22
O kulhnání ovcí.....	22
O tloustnutí ovcí.....	22
Chovatelská evidence.....	22
VI. Odchov jehňat.....	23
Připouštění.....	23
Bahnění.....	23
Pomůcky pro bahnění.....	24
Co hlídat před porodem.....	24
Zásahy během porodu.....	25
Ošetření čerstvě narozeného jehněte.....	26
Co hlídat po obahnění.....	27
Predátori.....	28
Domácí odchov jehňat.....	29
Zánět vemene.....	29
Odstav jehňat.....	30
VII. Průběh chovatelského roku.....	31
VIII. Jak dál.....	32
Co s produkcí.....	32
O užitkovosti.....	32
Brakace.....	33
Obnova stáda.....	33
Použitá a doporučená literatura.....	34

VII. Průběh chovatelského roku

Měsíc	Činnost	Poznámky, varianty
I-II	Dopínání ohrad (za mrazu). Vápnění. Ochrana dřevin (okus).	
III	Rozbor trusu, sledování kondice, kvalitní píce. Revakcinace. Stříž kolem vemen, odčervení dle rozborů, kontrola paznehtů a ušních známek.	Stříž min. týden před bahněním, odčervení jen přípravky vhodnými pro březi. Na konci III možná i celková stříž při vědomí rizik.
IV	Smykování luk. Opuštění zimoviště – jarní pastva. Příkrm senem. Začátek bahnění (půlka dubna).	Březost 148 dnů +- 5, první jehnata obvykle 145. den po připuštění, většina 150.-162. den.
V	Konec bahnění, péče o jehnata.	
VI	Po půlce měsíce sklizeň vyzrálého sena (nahlásit myslivcům).	Ve většině chovů celková stříž - min. 20 dní po bahnění. Doporučují až v IX.
VII	Uskladnění sena. Oddělení plemeníků od ovcí.	Stoh na zimovišti zakrytý netkanou textilií pro skladování sena.
VIII	Odčervení jehnát kolem tří měsíců věku (odstav). Oficiální označení (číslo) a nahlášení jehnát před prodejem (nejpozději do 6 měsíců). Na přelomu měsíce oddělení beránků, odstav jehnát.	Beránky připojit k plemeníkům. Doporučují nechat je u matek asi do čtyř měsíců kvůli růstu. V pěti měsících již hrozí zapuštění sester. Nutná chytačka k beránkům kvůli prodeji.
IX	Celková stříž ovcí, kontrola paznehtů a známek. Rozbor trusu. Sečení nedopasků, sklizeň otavy.	Pokud byla stříž provedena v březnu či červnu, je třeba zvážit v IX-X stříž zadků.
X	Prodej jehnát (pozor na ochranné lhůty odčervení). Podzimní výpasy. Sečení nedopasků. Odčervení chovných dle rozborů.	Na konci měsíce trhy plemenných beranů.
XI	Připuštění (koncem měsíce), příkrm senem.	Připustit nejpozději první týden XII. Nejdříve tak, aby se jehnata rodila do trávy.
XII	Krmení senem. Zazimování napajedel. Přechod na zimoviště.	Pokud je připouštěno více beranů, má každý svůj harém. Jejich spojení je nejdříve po třech týdnech a berani musejí být alespoň dva týdny odděleni pro zachování jistoty otcovství.

Průběžně: Kontrola ohrad, napajedel, lizů, dostatku krmení, zdraví ovcí. Kontrola označení zvířat (ušní známky). **Hlášení** úhynů či porážky chovných zvířat, nákupu zvířat a narození těch jehnát, která dosáhla 6 měsíců. Vedení evidencí.

